


## KAČENKA NÁPRSTKOVITÁ *(Verpa conica)*

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
---	----	-----	----	---	----	-----	------	----	---	----	-----

 Klobouk méně známé kačenky náprstkovité je 1,5–4 cm vysoký, 1–3 cm široký, žlutohnědý, okrově hnědý až hnědý, téměř **hladký nebo mírně zvrásněný, zvoncovitý, vzácněji mozkovitě zprohýbaný** (var. *cerebriformis*) přirostlý jen ke špičce třeně. Třeň je 3–10 (15) cm vysoký, 1–1,5 cm široký, válcovitý, křehký, lámavý, dutý, v mládí nepatrný, bělavý, smetanový, při zasychání oranžově hnědnoucí, jemně vločkatý až žlutohnědě šupinkatý. Dužnina je křehká, bělavá, na řezu nemění barvu. Voni a chuťná mírně, houbově.


**VÝSKYT:** Vzácně od dubna do května v **opadu růžokvětých dřevin** (například hlohů, trnek, třešní a střemchy) a v křovinách, nejčastěji v lužních lesích, ale i mimo les.

**VYUŽITÍ:** Jedlý druh průměrné kvality. Podobná kačenka česká (*Verpa bohemica*) se liší většími plodnicemi a zejména podélně mozkovitě žebrovaným, žlutookrově zbarveným kloboukem.



## SMRŽ POLOVOLNÝ *(Morchella semilibera)*

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
---	----	-----	----	---	----	-----	------	----	---	----	-----

 Klobouk je 2–5 cm vysoký a 1,5–3,5 cm široký, ostře kuželovitý, olivově nebo žlutě hnědý. **Podélná ostrá žebra na klobouku jsou**

**tmavohnědá až hnědočerná** s nižšími příčnými žilkami, jež utvářejí nepravidelné, různě hluboké, podélné jamky a důlky. Okraj klobouku je zřetelně

až do jedné třetiny délky klobouku u třeně volný. Třeň je vysoký 3–6 cm a široký 1,5–2 cm, válcovitý, směrem dolů mírně rozšířený, krémově bělavý, světle okrový, po celé ploše jemně zrníčkovitý. V horní části je téměř vrásčité zrnitý. Celá plodnice včetně klobouku je dutá. Houba voní a chuťná mírně, nevýrazně.

**VÝSKYT:** V dubnu a květnu nepříliš hojně **ve světlých teplých listnatých hájích, zahradách a sadech**, nejčastěji pod ovocnými stromy a jasanů. Upřednostňuje lužní lesy, podobně jako kačenka náprstkovitá.

**VYUŽITÍ:** Jedná se o dobrý jedlý druh, který ale není příliš chuťově výrazný, proto se hodí spíše do směsí s jinými druhy. **Od ostatních smržů se výrazně liší kloboukem**, který přirůstá ke třeni asi v polovině, zatímco jiné smrže mají celý klobouk přirostlý svým spodním okrajem.





**SMRŽ OBEČNÝ***(Morchella esculenta)*

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII



**🍄** Klobouk smrže obecného je 3–8 (10) cm vysoký i podobně široký, **nepravidelně kulovitý nebo vejčitý, spodním okrajem přirostlý ke třeni**, dutý, na celém povrchu pokrytý nepravidelně tvarovanými jamkami a šikmě kolmými přepážkami. Barva klobouku je žlutookrová, medově nažloutlá až světle hnědožlutá. Třeň dorůstá výšky 5–15 cm a šířky 2–6 cm, je dutý, křehký, válcovitý, na bázi kyjovitě rozšířený, **v mládí bělavý až krémový, později nažloutlý, místy nahnědlý** nebo rezavě hnědavý. Dužnina je křehká, v klobouku žlutookrová až hnědavě okrová, jinak bělavá. Voní i chutná příjemně, nevýrazně.

**VÝSKYT:** Roztroušeně od dubna do května **v listnatých lesích, parcích, ovocných sádech, křovinách, zahradách**, nejčastěji pod jasany, akáty, jabloněmi, třešněmi a lískami, zejména na vápenitých půdách.

**VYUŽITÍ:** Výtečný jedlý druh, který se **nejčastěji připravuje zapečený** na různé způsoby či naplněný nádivkou.

**SMRŽ KUŽELOVITÝ***(Morchella conica)*

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

**🍄** Klobouk je 4–8 (10–13) cm vysoký, 2–6 cm široký, dutý, přirostlý ke třeni po celé délce. V mládí má vejčitý tvar, později je vejčitě kuželovitý, v horní části tupě zašpičatělý, **s prohlubněmi a šikmými příčnými přepážkami**, které jsou nejdříve okrově našedlé, později zelenavě černohnědé. Prohlubně jsou v mládí okrové, později až hnědoolivové až nazelenalé. Třeň je 3–7 (8) cm vysoký, 1–3 cm široký, dutý, válcovitý, v dolní části kyjovitě rozšířený, naokrovělý a jemně vločkatě zrnitý. Dužnina je křehká, bělavá až lehce naokrovělá.

Smrž kuželovitý voní příjemně, houbově a chutná mírně nasládle.

**VÝSKYT:** Nehojně od dubna do května **v listnatých (pod jasany) i jehličnatých lesích (pod smrky)**, zejména na

jejich okrajích, ale i na lesních loukách, v sádech, mýtinách, bývalých skládkách dřeva apod.

**VYUŽITÍ:** Jedná se o **výborný jedlý druh**, podobně jako ostatní druhy smržů.

